

Data : 11/08/2018

Sede prelievo : Stomaco

Dati clinici : Ulcera

Mat. in esame: Biopsie multiple

Sig :


Via :

Cap : Citta' :

Data di nascita: 18/09/1967 Tel:

Valutazione diagnostica

Carcinoma gastrico del tipo intestinale sec. Lauren




Esame macroscopico

Frammenti multipli. Si includono in garza. 1 cestello

Esame microscopico

I frammenti in esame mostrano estesa proliferazione neoplastica per lo più diffusa caratterizzata da cellule con nucleo ampiamente pleomorfo , ipercromatico e con evidenti incisure della membrana. Presenza di talune figure mitotiche atipiche. La presenza di accumulo di mucina intracitoplasmatica mostra talora cellule con nucleo lateroposto. Tali cellule si raggruppano a costituire strutture tubulari e focalmente in elementi singoli.



Data : 11/08/2018

Sede prelievo : 1) Stomaco 2) Duodeno

Dati clinici : Dato non disponibile

Mat. in esame: Biopsie multiple

Sig :


Via :

Cap : Citta' :

Data di nascita: 12/04/1965 Tel:

Valutazione diagnostica

- 1) Mucosa gastrica modicamente iperemica HP negativa.
- 2) Mucosa duodenale esente da alterazioni istologiche di rilievo.



Esame macroscopico

- 1) frammenti multipli. Si includono in garza. Cestello 1
- 2) Frammenti multipli. Si includono in garza. cestello 2

Esame microscopico

1) Frammenti di mucosa gastrica con iperemia, edema e modesto infiltrato infiammatorio linfoplasmacellulare e granulocitario. La componente ghiandolare appare normoconformata. La mucosa mostra ghiandole foveolari che occupano approssimativamente la metà superiore dello spessore mucoso. Tali ghiandole che mostrano una certa uniformità sono costituite da tubuli ampiamente ramificati. Negativa risulta la ricerca di colonie batteriche di *Helicobacter Pylori*.

2) Frammenti di mucosa duodenale con una componente villosa ben rappresentata, una componente criptica normoconformata e presenza nello stroma di un modesto infiltrato infiammatorio prevalentemente linfoplasmacellulare. Lungo la superficie epiteliale si osservano focali fenomeni di linfocitosi intraepiteliale.

Il brush border costituito dai microvilli è evidente. Ben disegnata è la membrana basale subepiteliale che separa la lamina propria dal compartimento subepiteliale.

